

Chlorothalonil 720F

FONGICIDE à large spectre pour gazon et aménagements ornementaux.



Chlorothalonil 720F est le fondement de votre programme de lutte intégrée.

Economique et rentable il contrôle un large spectre de maladies du gazon, de certains arbres, arbustes et fleurs.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Excelle avec la plupart des fongicides dans les mélanges en réservoir.

Mode d'action de contact pour des résultats rapides.

Activité Multi-Site qui signifie qu'aucune résistance sera développée suite à un usage répété.

Homologué pour une utilisation sur le gazon et certaines plantes ornementales.

SPÉCIFICATIONS

Matière active : Chlorothalonil

Formule : 720 grammes par litre de fluide

Emballage : 2 x 7 litres

Taux d'application : voir l'étiquette

Groupe de fongicide : Groupe M (multi-site, de contact, préventif)

MALADIES CONTRÔLÉES

Protection préventive contre la majorité des maladies du gazon et des plantes ornementales incluant :

Brûlure en plaques	Fusarium
Tache brune	Rouille
Tache des feuilles	Botrytis
Anthraxose	Moisissure rose et grise des neiges

Chlorothalonil 720F



Efficace sur les tertres, verts et les allées de terrain de golf et les plantes ornementales.

Appliquer Chlorothalonil 720F dans une quantité suffisante d'eau pour assurer une couverture complète.

Voir le tableau ci-dessous pour les taux et les intervalles d'application.

Appliquer Chlorothalonil 720F lorsque les conditions sont favorables au développement des maladies et répéter les applications aussi longtemps que les conditions persistent.

Dans le cas d'affections sévères, utiliser la dose curative et appliquer sur un intervalle de 7 jours.

TYPE CULTURE	MALADIE	INTERVALLE D'APPLICATION	TAUX ml DE PRODUIT PAR 100 METER ²	
			PRÉVENTIF*	CURATIF**
Allées	Brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>)	7 - 14 jours	33 - 66	
	Taches de la feuille (<i>Bipolaris sp.</i> , <i>Drechslera sp.</i> , <i>Exosporium sp.</i>)	7 - 14 jours	66 - 132	
	Tache brune (<i>Rhizoctonia solani</i>)	7 - 14 jours	66 - 132	
Tertres, verts, Plantes ornementales	Brûlure en plaques	7 - 14 jours	66 - 132***	132 - 243
	Taches de la feuille et fonte des semis (<i>Drechslera poae</i>)	7 - 10 jours	66 - 132	132 - 243
	Tache brune	7 - 10 jours	66 - 132	132 - 243
	Anthraxose (<i>Colletotrichum cereale</i>)	7 - 10 jours	118 - 132	N/A
	Moisissure grise (<i>typhula incarnata</i>) et moisissure rose des neiges (<i>microdochium nivale</i>)		167 - 347 ****	N/A

* Taux recommandés pour la prévention de la maladie ; utiliser le taux inférieur lorsque les conditions propices à la maladie sont légères ou modérées et utiliser le taux le plus élevé lorsque les conditions sont sévères.

** Taux pour un intervalle de 7 jours lorsque la maladie est présente. Le taux le plus élevé doit être appliqué sous de sévères conditions.

*** Appliquer Chlorothalonil 720F à 132 millilitres en mélange avec 26 millilitres de Quali-Pro® Propiconazole 14.3 ME par 100 m² et un intervalle de 21-28 jours pour contrôler la brûlure en plaques.

Distribué par:

1 800 361-9184

3370, Le Corbusier,
Laval, QC H7L 4S8

PlantProducts.com

