



# EXTRAIT DE VARECH 0-0-16

## ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Extrait de varech (*Ascophyllum nodosum*)...100%

Potasse Soluble (K<sub>2</sub>O).....16%

**DÉRIVÉ DE:** Extrait de varech (*Ascophyllum nodosum*)

L'extrait de varech d'EZ-Gro est une poudre raffinée d'extrait de varech. Il favorise la germination et la croissance des semences et des plantes. Il aide également à stimuler la résistance et les rendements des cultures. L'extrait de varech d'EZ-Gro contient les régulateurs naturels de croissance de plante trouvés dans le varech et augmente la résistance au stress abiotique.

## TAUX D'APPLICATION

| CULTURE   | TAUX D'APPLICATION                | INSTRUCTIONS  |
|---|-----------------------------------|---|
| Application générale et fleurs, légumes, fruits et plantes en pot | 1 g (1/4 c. à thé)/l d'eau        | Appliquer une fois par semaine tout au long du cycle de croissance et de floraison          |
| Semences et bulbes  |                                   | Laisser tremper toute une nuit. Après la plantation, arroser avec la même solution.         |
| Semences pour l'ensemencement du champ, boutures                  |                                   | Immerger brièvement. Après la plantation, arroser avec la même solution.                    |
| Sol et compostage   | 1 kg par 100 kg sol/compost       | Mélanger le produit sec ou diluer 200 à 300 fois et asperger le sol/compost avec le liquide |
| Cultures hydroponiques et cannabis                                | ½-1 g (1/8-1/4 c. à thé)/ l d'eau | Ajouter à racines une fois par semaine tout au long du cycle de croissance et de floraison  |

| CULTURE   | TAUX D'APPLICATION (KG/HA) | INSTRUCTIONS  |
|---|----------------------------|---|
| Légumes, y compris les légumes-feuilles, les légumineuses, les crucifères, les cultures du genre <i>Allium</i> , etc. | 1-1.5                      | Au stade à 6 feuilles ou 2-3 semaines après l'apparition des feuilles. Répéter toutes les 2 à 3 semaines et après chaque récolte. |
| Tomates, pommes de terre, poivrons, aubergines  | 1                          | Une fois par semaine après la transplantation tout au long de la saison   |
| Vergers/Vignobles   | 1-1.5                      | Juste avant la floraison. Répéter toutes les 2 à 3 semaines.  |
| Tourbe  | 0.3-0.8                    | Toutes les 2 semaines après l'apparition des feuilles   |
| Pâturage/foin/prairie   | 1-1.5                      | Vaporiser 2 semaines après l'apparition, réappliquer après le pâturage ou la coupe  |
| Plantes de grande culture, incluant le blé, le canola, le soja, le maïs, etc.   | 0.75                       | Au stade de 3 à 5 feuilles ou appliquer lors de l'application de fongicide  |



**ATTENTION - Garder hors de portée des enfants et des animaux.** Entreposer dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec. | Portez des vêtements et des gants de protection. | Éliminer le contenu et l'emballage conformément aux exigences locales, régionales et fédérales.

**No. de Lot:**  
**Date d'expiration:**

# 25 KG