

Propiconazole 14.3 ME

Fongicide à large spectre pour gazon

Pour un contrôle économique, à large spectre, des maladies du gazon au Canada.

- ▶ Formulation à microémulsion qui dégage moins d'odeur, qui a une meilleure stabilité et une excellente couverture
- ▶ Mode d'action systémique local qui assure une protection de longue durée
- ▶ Excellent mélange en réservoir avec la plupart des fongicides



Formulation	14,3 % microémulsion à base d'eau (154,5g/litre)
Matière active	Propiconazole
Même matière active que	Banner Maxx®
Emballage	2 x 5 litres/caisse
Taux d'application	Voir la fiche technique pour tous les détails
Mode d'action	Systémique
Groupe	Fongicide du groupe 3
Entreposage	Éviter le gel

Contrôle plusieurs maladies du gazon dont :

- La rouille
- La moisissure rose et grise des neiges
- La brûlure en plaques
- La plaque estivale
- L'anthraxnose
- La tache de la feuille
- La plaque brune
- La fusariose
- Le filament rouge
- La fonte du semis
- La plaque jaune



QUALI-PRO

Produits de qualité pour les gazons

Quali-Pro.ca

Propiconazole 14.3 ME

QUALI-PRO

PÉRIODES D'APPLICATION DU QUALI-PRO PROPICONAZOLE 14.3 ME

Maladie	Taux d'application (mL/100m ²)	Intervalle d'application / Durée de contrôle*	Instructions
Brûlure en plaques	26-51	21-28 jours	Appliquer Quali-Pro Propiconazole 14.3 ME lorsque les jours sont chauds et humides et que les nuits sont fraîches (ce qui favorise la formation de rosée). Une déficience en azote et la sécheresse peuvent aussi favoriser la maladie. 1. Peut être mélangé en réservoir (voir les instructions de mélange) avec les fongicides DACONIL® 2787 liquide ou le HERITAGE® OU 2. En alternance avec des fongicides de mode d'action différent. Ne pas appliquer plus de 6 fois par saison fongicides qui ont un mode d'action différent.
Anthraxose	26-51	21 jours	Appliquer lorsque les conditions sont chaudes et humides. La compaction du sol, un mauvais drainage, l'excès de chaume ou de grandes quantités de <i>Poa annua</i> favorisent le développement de l'anthraxose. Ne pas appliquer plus de 3 fois par saison.
Filament rouge	51	14 jours	Appliquer lorsque les conditions sont fraîches et humides. Les périodes prolongées de forte humidité favorise le développement de la maladie. Ne pas appliquer plus de 3 fois par saison.
La plaque brune	51-103	14 jours	Appliquer préventivement lorsque les conditions favorisent le développement des maladies (rosée ou humidité et températures nocturnes chaudes). Utilisez le taux le plus élevé lors de pression sévère. Ne pas appliquer si les symptômes de la maladie sont présents. Ne pas appliquer plus de 6 fois par saison.
Tache de la feuille et fonte du semis	51-103	14 jours	Lors d'une présence légère à modérée de la maladie, appliquer afin de réduire la gravité des taches de la feuille et de la fonte du semis causés par le <i>Drechslera</i> spp. (<i>Helminthosporium</i>). Ne pas appliquer plus de 3 fois par saison.
Plaque estivale	103	30 jours	Appliquer de façon préventive. La 1 ^{ère} application devrait être faite lorsque la température du sol est supérieure à 16°C à une profondeur de 5cm, pour 4 jours consécutifs. Faire une 2 ^e application 30 jours plus tard. Une troisième application peut être nécessaire si la température est chaude et humide. Appliquer avec 13-21 litres d'eau par 100m ² . Ne pas appliquer plus de 3 fois par saison.
Moisissure rose et grise des neiges	206	Tard à l'automne	Faire une application tard à l'automne, avant la neige. Ne pas appliquer sur la neige ou lorsque la température est inférieure à 0°C. Ne pas appliquer plus de 1 fois par saison.
Fusariose	51-103	30 jours	Appliquer à l'automne ou tôt au printemps lors de temps frais et humide. Utiliser le taux le plus élevé sous la pression élevée de la maladie. Ne pas appliquer plus de 2 fois par saison.
Plaque jaune	77-103	Tard à l'automne	Faire une application tard à l'automne, avant la neige. Ne pas appliquer sur la neige. Ne pas appliquer plus de 1 fois par saison.

* La durée prévue du contrôle lorsqu'il est utilisé dans un programme préventif de lutte contre la maladie.



Supérieur ou égal à™

La formulation des produits Quali-Pro® est d'une qualité inégalée qui leur donne une performance équivalente à celle des produits concurrents qu'ils remplacent.

Pour plus d'informations :

Don Surgeoner, directeur de Quali-Pro pour le Canada
(519) 535-2409 • dsurgeon@manainc.com